

● ● Pic vert *Picus viridis*
European Green Woodpecker

L 33 cm E 42 cm P 220 gr

Picidés



► Le Pic vert fréquente les lisières des bois clairs, les prairies et les pâturages où des bosquets et des haies avec de vieux arbres sont présents. Farouche, toujours en alerte, il s'envole dès qu'il se sent observé.




Identification

Adultes (en toutes saisons)

Dos verdâtre avec le croupion jaune. Calotte et nuque rouge (finement tachetée de gris), masque noire autour des yeux. Moustache rouge chez le mâle et noire chez la femelle. Oeil blanc. Ventre et poitrine crème, finement barré sur le dessous. Queue jaune comme le croupion, barrée, plus foncée aux extrémités. Ailes vertes, avec les rémiges primaires noires avec des taches blanches.

Juvénile

Nombreuses taches noires sur le ventre, la poitrine et les joues. Moustache rouge pour le mâle (plus discrète que chez l'adulte) et noire pour la femelle. Calotte rouge tachetée de gris. Dos plus terne, taches blanches au bout des plumes.



Sous-espèce.

- *Picus viridis sharpei*

Présent dans la péninsule ibérique, il se différencie par l'absence de masque noire, mais par une zone plus gris foncé. Il garde la différenciation mâle, femelle, au niveau de la moustache.



Distribution, habitat et nidification

Pic verdâtre le plus commun avec 600 000 à 1 300 000 couples, son aire de répartition est largement étendue sur une majorité des pays européens. Sédentaire, il vit solitaire ou en couple dans son territoire (1 à 3,5 km²). On le retrouve dans les parcs et jardins, les vergers, les lisières des forêts (principalement des feuillus), les prairies et pâturages, et d'une manière générale, dans tous les milieux ouverts où sont présents

des haies et des grands arbres. Il niche dans une loge qu'il a creusé dans un vieil arbre (sain ou mort) ou en squattant une loge existante qu'il adapte à ses mensurations.



Comportement et moeurs

Le Pic vert se nourrit principalement de fourmis qu'il débusque en sautillant au sol. Quand il découvre une fourmière, il défonce l'ouverture avec son bec et plonge son langue gluante pour happer les fourmis. Sa langue mesure près de 10 cm, elle est enroulée autour du crâne et il est capable de la projetée au-delà de son bec. Le bout est enduit d'un mucus collant qui lui permet de piéger ses proies.

Même si on le trouve souvent au sol, il a toutes les caractéristiques des autres Pics pour se maintenir aux troncs d'arbres; les plumes de la queues (rectrices), rigides, qui servent d'appui et les pattes avec 2 doigts devant et 2 doigts derrière, aux ongles courbés.

Son vol chaloupé est une alternance de battements et de longs planés, ailes repliées. Il ne vole à découvert que sur de courtes distances (300 mètres), se po-

sant sur un tronc, à l'affût.

Très farouche, il est toujours sur le qui vive et s'envole dès qu'il se sent observé en poussant un cri sonore, pareil à un ricanement (Kiu-Kiu-Kiu), qui peut s'entendre à plus d'un kilomètre. Contrairement aux autres grands Pics, il ne tambourine qu'occasionnellement.

►
Le Pic vert se nourrit le plus souvent au sol, de fourmis qu'il happe avec sa langue collante.

